# 令和２年度　松本市内河川水生生物調査結果表　　その１

Ⅰ：きれいな水　　Ⅲ：きたない水
Ⅱ：少しきたない水　Ⅳ：大変きたない水

| 調査地点 | 調査年月日 | 天気 | 水温(℃) | 川幅(m) | 生物を採取した場所 | 生物採取場所の水深(cm) | 流れの速さ | 川底の状態 | 指標生物の出現状況 Ⅰ 1カワゲラ類 | 2ヒラタカゲロウ類 | 3ナガレトビケラ類 | 4ヤマトビケラ類 | 5アミカ類 | 6ヨコエビ類 | 7ヘビトンボ | 8ブユ類 | 9サワガニ | 10ナミウズムシ | Ⅱ 1コガタシマトビケラ類 | 2オオシマトビケラ | 3ヒラタドロムシ類 | 4ゲンジボタル | 5コオニヤンマ | 6カワニナ類 | 7ヤマトシジミ | 8イシマキガイ | Ⅲ 1ミズカマキリ | 2ミズムシ | 3タニシ類 | 4シマイシビル | 5ニホンドロソコエビ | 6イソコツブムシ類 | Ⅳ 1ユスリカ類 | 2チョウバエ類 | 3アメリカザリガニ | 4エラミミズ | 5サカマキガイ | 水質階級の判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女鳥羽川 寺前橋 | R3.3.4 | 晴れ | 4.0 | 4 | 中央 | 35 | ふつう | こぶし大～頭大石 | ● | ● | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ⅰ |
| 女鳥羽川 原橋 | R3.3.4 | 晴れ | 4.0 | 4 | 中央 | 10 | はやい | こぶし大石～母岩露出、砂 | ● | ● | ○ | | | | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ⅰ |
| 女鳥羽川 桜橋 | R3.3.4 | 晴れ | 7.0 | 3 | 中央 | 25 | ふつう | こぶし大石、砂 | ● | ● | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ⅰ |
| 女鳥羽川 源橋（みなもと） | R3.3.4 | 晴れ | 10.0 | 8 | 中央 | 20 | はやい | こぶし大～頭大石、砂 | ○ | ● | | | | | | ● | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | Ⅰ |
| 女鳥羽川 幸橋（さいわい） | R3.3.4 | 曇り | 11.0 | 6 | 中央 | 30 | はやい | こぶし大石 | ○ | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | Ⅰ |
| 湯川 出口 | R3.3.4 | 晴れ | 9.0 | 6 | 中央 | 15 | おそい | こぶし大石、砂、ヘドロ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ● | | ○ | | | ● | | | | | Ⅲ |
| 蛇川 中流 | R3.3.4 | 曇り | 13.0 | 1.6 | 中央 | 8 | おそい | 小石、砂 | | | | ● | | ○ | | ● | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | Ⅰ |

○　見つかった指標生物
●　数が多かった２種類

# 令和２年度　松本市内河川水生生物調査結果表　　その２

Ⅰ：きれいな水　　Ⅲ：きたない水
Ⅱ：少しきたない水　Ⅳ：大変きたない水

| 調査地点 | 調査年月日 | 天気 | 水温(℃) | 川幅(m) | 生物を採取した場所 | 生物採取場所の水深(cm) | 流れの速さ | 川底の状態 | 指標生物の出現状況 Ⅰ 1カワゲラ類 | 2ヒラタカゲロウ類 | 3ナガレトビケラ類 | 4ヤマトビケラ類 | 5アミカ類 | 6ヨコエビ類 | 7ヘビトンボ | 8ブユ類 | 9サワガニ | 10ナミウズムシ | Ⅱ 1コガタシマトビケラ類 | 2オオシマトビケラ | 3ヒラタドロムシ類 | 4ゲンジボタル | 5コオニヤンマ | 6カワニナ類 | 7ヤマトシジミ | 8イシマキガイ | Ⅲ 1ミズカマキリ | 2ミズムシ | 3タニシ類 | 4シマイシビル | 5ニホンドロソコエビ | 6イソコツブムシ類 | Ⅳ 1ユスリカ類 | 2チョウバエ類 | 3アメリカザリガニ | 4エラミミズ | 5サカマキガイ | 水質階級の判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薄川金華橋 | R3.3.5 | 雨 | 6.0 | 8 | 中央 | 44 | はやい | こぶし大～頭大石 | | ● | ● | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ⅰ |
| 薄川出口 | R3.3.5 | 雨 | 7.0 | 7 | 中央 | 53 | はやい | こぶし大石～頭大石 | ● | ● | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ⅰ |
| 穴田川第二井川城橋 | R3.3.5 | 曇り | 15.5 | 3 | 中央 | 13 | おそい | 小石、砂、ヘドロ | | | | | | | | ○ | ○ | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ○ | ○ | Ⅰ |
| 田川田川橋 | R3.3.5 | 曇り | 10.0 | 20 | 中央 | 25 | はやい | こぶし大～頭大石 | | ● | ○ | | | | | ● | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ⅰ |
| 田川新田川橋 | R3.3.5 | 曇り | 8.5 | 21 | 中央 | 22 | はやい | こぶし大～頭大石 | ● | ● | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ⅰ |
| 大門沢川中流 | R3.3.5 | 曇り | 7.0 | 3 | 中央 | 17 | ふつう | こぶし大～頭大石、砂 | | | ○ | | | | | ● | ○ | | | | | | | ○ | | | | ● | | | | | | | ○ | | | | Ⅰ |

○　見つかった指標生物
●　数が多かった２種類