

流行前の予防接種が効果的です

## 高齢者インフルエンザ 予防接種が始まります

●問い合わせ 健康づくり課（東庁舎 2階 ☎34-3217 📠39-2523）

下記に該当する方は、インフルエンザにかかるると重症化しやすく、インフルエンザワクチン接種による重症化の予防効果による便益が大きいと考えられるため、予防接種法に基づく定期接種となっています。

特に今冬は、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行が懸念されることから、定期接種対象の方で接種を希望される方には早めの接種を推奨しています。

予防接種を希望する方は、かかりつけの医師とよく相談の上、接種を受けるか否か判断してください。なお、接種を受ける法律上の義務はありません。対象の方には通知をお送りしますので、詳細は通知をご覧ください。

### 対象者

松本市民で、次の条件のいずれかに該当する方

- ① 65歳以上の方で、昭和30年12月31日以前に生まれた方
- ② 60～64歳の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能などに障害がある方

### 接種期間

10月5日(月)～令和3年1月15日(金)

### 接種費用

自己負担1,200円 ※生活保護世帯は無料



## ロタウイルス感染症 予防接種が定期接種へ

●問い合わせ 健康づくり課（東庁舎 2階 ☎34-3217 📠39-2523）

10月1日から、ロタウイルス感染症の予防接種は、予防接種法に基づく定期接種になります。対象の方には通知をお送りします。重症胃腸炎の予防のため、ロタウイルスワクチンを接種しましょう。

なお、ワクチンは、ロタリックスとロタテックの2種類があります。どちらか1種類を接種し、原則として途中でワクチンを変更することはできません。取り扱いワクチンは、各医療機関にお問い合わせください。

### 対象者

令和2年8月1日以降に生まれたお子さん

### 接種費用

無料

### 接種時期と回数

- 出生6週0日後から接種を受けることができます。
- 初回接種は、出生14週6日後までに受けることが推奨されています。
- ロタリックスは、出生24週0日後までに27日以上の間隔をおいて2回接種、ロタテックは、出生32週0日後までに27日以上の間隔をおいて3回接種します。

### お知らせ

10月1日から、異なるワクチンの接種間隔が一部改正されます。詳細は、市ホームページをご覧ください。か、健康づくり課へお問い合わせください。

### ロタウイルス感染症とは？

ロタウイルスによって引き起こされる急性の胃腸炎で、乳幼児期（0～6歳頃）にかりやすい病気です。

主な症状は、水のような下痢、吐き気、嘔吐、発熱、腹痛です。5歳までの急性胃腸炎の入院患者のうち、40～50パーセント前後はロタウイルスが原因です。

ワクチンを接種することにより、ロタウイルス胃腸炎による入院患者を約70～90パーセント減らすことができたと報告されています。